TABLA DE MEDICAMENTOS PARA VIH DE POSITIVELY AWARE 2025
EDICIÓN DE BOLSILLO

POSITIVELY AWARE

PATROCINADA POR Walgreens

Se recomienda el uso de cada medicamento en combinación con otros antirretrovirales, excepto aquellos de una sola pastilla o régimen completo de acción prolongada o Apretude para PrEP. Para una descripción completa de las recomendaciones de medicamentos del HHS, vaya a clinicalinfo.hiv.gov/es. Consulte con un proveedor de atención médica sobre cuál es la terapia farmacológica y dosis adecuadas para usted; vea la página de información del medicamento o prospecto para obtener información completa. Información de la tabla de medicamentos vigente al 31° de marzo de 2025. Busque su medicamento ingresando el nombre luego de escribir positivelyaware.com/ en su buscador (por ejemplo, positivelyaware.com/*biktarvy*).

REGÍMENES DE UNA SOLA PASTILLA (Régimen completo compuesto de varias clases de medicamentos)

Atripla ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabina, 300 mg tenofovir DF
EFV (ITINN), FTC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con el estómago vacío, preferentemente a la hora de acostarse.
■ Disponible como genérico.

Biktarvy ★
Se recomienda como régimen inicial para la mayoría de las personas sin historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabina, 25 mg tenofovir AF
BIC (INSTI), FTC y TAF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda este régimen para un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.

Complera ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas si la carga viral es <100,000 copias/ml y el recuento de CD4 es >200 células/mm³

25 mg rilpivirina, 200 mg emtricitabina, 300 mg tenofovir DF
RPV (ITINN), FTC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir durante una comida.

Delstrigo ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

100 mg doravirina, 300 mg lamivudina, 300 mg tenofovir DF
DOR (ITINN), 3TC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.

Dovato ★
Se recomienda como régimen inicial para la mayoría de las personas excepto para aquellas con carga viral >500,000 copias/ml, infección simultánea con VHB o previo a los resultados de la genotipificación de la resistencia o de la prueba de VHB, sin historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

50 mg dolutegravir, 300 mg lamivudina
DTG (INSTI), 3TC (ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda este régimen para un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.

Genvoya ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas y si no hay historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat,
200 mg emtricitabina, 10 mg tenofovir AF
EVG (INSTI), COBI (potenciador FC), FTC y TAF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir junto con alimentos.

REGÍMENES DE UNA SOLA PASTILLA cont. (Régimen completo compuesto de varias clases de medicamentos)

Juluca ✔
Se recomienda como terapia de continuación para personas con carga viral de VIH indetectable por al menos 6 meses

50 mg dolutegravir, 25 mg rilpivirina
DTG (INSTI), RPV (ITINN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir durante una comida.

Odefsey ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas si la carga viral es <100,000 copias/ml y el recuento de CD4 es >200 células/mm³

25 mg rilpivirina, 200 mg emtricitabina, 25 mg tenofovir AF
RPV (ITINN), FTC y TAF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir durante una comida.

Stribild ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas y sin historial de Apretude (CAB-LA para PrEP)

150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat,
200 mg emtricitabina, 300 mg tenofovir DF
EVG (INSTI), COBI (potenciador FC), FTC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir junto con alimentos.

Symfi ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

600 mg efavirenz, 300 mg lamivudina, 300 mg tenofovir DF
EFV (ITINN), 3TC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Debe ingerirse con el estómago vacío, preferentemente a la hora de acostarse.
■ Disponible como genérico.

Symfi Lo ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

400 mg efavirenz, 300 mg lamivudina, 300 mg tenofovir DF
EFV (ITINN), 3TC y TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Debe ingerirse con el estómago vacío, preferentemente a la hora de acostarse.
■ Disponible como genérico.

Symtuza ✔
Se recomienda como régimen inicial en ciertas situaciones clínicas; también para un rápido TAR para personas que tomaron Apretude (CAB-LA) para PrEP

800 mg darunavir, 150 mg cobicistat,
200 mg emtricitabina, 10 mg tenofovir AF
DRV (IP), COBI (potenciador FC), FTC y TAF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir junto con alimentos.
➤ Para quienes tomaron Apretude (CAB-LA) para PrEP, HHS recomienda este régimen para un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.



Triumeq ★
Se recomienda como régimen inicial para la mayoría de las personas si HLA-B*5701 es negativo y no tienen historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

50 mg dolutegravir, 600 mg abacavir, 300 mg lamivudina
DTG (INSTI), ABC y 3TC (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Una pastilla de 50 mg adicional de Tivicay con un intervalo de 12 horas cuando se toma con ciertos otros medicamentos. Ingerir con o sin alimentos.

INHIBIDOR DE LA CÁPSIDE INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA

Sunlenca ●
Para personas que ya han hecho varios tratamientos cuyo régimen actual no esté funcionando

lenacapavir (LEN)
Dos opciones iniciales diferentes recibiendo LEN en pastillas orales y LEN inyectable, seguido de una dosis de mantenimiento de 463.5 mg/1.5 ml vía dos inyecciones subcutáneas (para una dosis total de 927 mg/3 ml) una vez cada seis meses, administrada por un proveedor de atención médica. Debe utilizarse como parte del régimen en conjunto con otro(s) antirretroviral(es), la mayoría de los cuales se toman diariamente.

RÉGIMEN COMPLETO DE ACCIÓN PROLONGADA INYECTABLE

Cabenuva ★
Se recomienda como terapia de optimización para personas con carga viral de VIH indetectable por al menos 3 meses de tratamiento

cabotegravir de acción prolongada, rilpivirina de acción prolongada
CAB-LA (INSTI), RPV-LA (ITINN)
Opcionalmente, comprimidos con las comidas durante un mes para comenzar, luego dos inyecciones intramusculares en glúteo, una vez cada dos meses (también hay dosis mensuales disponibles) administradas por un proveedor de atención médica. Se puede aplicar con o sin alimentos. Consiste en una inyección de cabotegravir de acción prolongada y una inyección de rilpivirina de acción prolongada. Vea información sobre la administración de dosis en la Guía de Medicamentos para VIH de POSITIVELY AWARE.

INHIBIDORES DE LA FIJACIÓN/ENTRADA

INHIBIDOR DE LA FIJACIÓN

Rukobia ▼
Para personas que ya han hecho varios tratamientos

fostemsavir (FTR)
Una pastilla de 600 mg dos veces al día. Para personas que ya han hecho varios tratamientos, que presentan un virus resistente a múltiples medicamentos y cuyo tratamiento contra el VIH no esté funcionando debido a cuestiones de resistencia, intolerancia o seguridad. Ingerir con o sin alimentos.

INHIBIDOR DE LA ENTRADA: ANTAGONISTA DE CCR5

Selzentry ▼
Para personas que ya han hecho varios tratamientos que tienen virus con tropismo CCR5

maraviroc (MVC)
150, 300 o 600 mg (disponible en pastillas de 150 y 300 mg), dos veces por día, según los otros medicamentos que tome. Ingerir con o sin alimentos.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas de 50 mg y 300 mg. Solución oral de 20 mg/ml solo disponible como medicamento de marca.

INHIBIDOR DE LA ENTRADA DE ACCIÓN PROLONGADA: INHIBIDOR POSFIJACIÓN QUE SE DIRIGE A LAS CD4

Trogarzo ▼
Para personas que ya han hecho varios tratamientos

ibalizumab-uiyk (IBA)
Se administra una vez cada dos semanas por infusión intravenosa. El tratamiento comienza con una dosis inicial de 2,000 mg intravenosa, seguida de otra infusión o empuje intravenoso de 800 mg de dosis de mantenimiento administrada en lo sucesivo cada dos semanas.

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA (INSTI)

Isentress HD ✔ y Isentress
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas sin historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

raltegravir (RAL)
Isentress HD: Dos pastillas recubiertas de 600 mg, una vez por día.
Isentress: Una pastilla recubierta de 400 mg, dos veces por día.
Ingerir con o sin alimentos.

Tivicay ★
Se recomienda como un componente de régimen inicial para la mayoría de las personas sin historial de Apretude (CAB-LA) para PrEP

dolutegravir (DTG)
Una pastilla de 50 mg, una vez por día, para personas que realizan terapia para VIH por primera vez o para personas que ya han hecho varios tratamientos sin previa resistencia a INSTI. Administración dos veces por día para personas que han presentado resistencia viral a INSTIs o cuando se toma con otros ciertos medicamentos. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda este régimen para un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS

Cimduo ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas cuando se combina con Tivicay; se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas cuando se administra con otras combinaciones

300 mg lamivudina, 300 mg tenofovir DF
3TC, TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda esta combinación de dosis fija como un componente de un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.

Descovy ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas

200 mg emtricitabina, 25 mg tenofovir AF;
120 mg emtricitabina, 15 mg tenofovir AF
FTC, TAF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda esta combinación de dosis fija como un componente de un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.

Emtriva ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas

200 mg emtricitabina (FTC)
Una cápsula, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
■ Disponible como genérico y de marca para cápsulas orales de 200 mg. Solución oral de 10 mg/ml solo disponible como medicamento de marca.

Epivir ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas

lamivudina (3TC)
Una pastilla de 300 mg, una vez por día; o una pastilla de 150 mg, dos veces por día. Ingerir con o sin alimentos
■ Disponible como genérico.

Epzicom ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas en combinación con Tivicay, si HLA-B*5701 es negativo

600 mg abacavir, 300 mg lamivudina
ABC, 3TC (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
■ Se discontinuó la marca Epzicom; pastillas orales de abacavir 600 mg / lamivudina 300 mg están disponibles como genérico

Truvada ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas

200 mg emtricitabina, 300 mg tenofovir DF
FTC, TDF (dos ITIN)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
➤ Se recomienda esta combinación de dosis fija como un componente de un rápido TAR para personas con diagnóstico reciente o que ingresan a la atención sin, o con mínimos, análisis de laboratorio disponibles.
■ Disponible como genérico.

Viread ★
Se recomienda como un componente de un régimen inicial para la mayoría de las personas

300 mg tenofovir DF (TDF)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas orales de 300 mg. Polvo oral 40 mg/gm y pastillas orales de 150 mg, 200 mg y 250 mg solo disponibles como medicamento de marca.

PIDA MÁS COPIAS de la edición de bolsillo de la Tabla de Medicamentos para VIH o de la Guía de Medicamentos para VIH de POSITIVELY AWARE - en español o inglés. Vaya a positivelyaware.com/subscribe. Consulte la Guía de Medicamentos para VIH completa en positivelyaware.com.

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO ANÁLOGOS DE LOS NUCLEÓSIDOS

Edurant ✔
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas en combinación con dos ITIN recomendados

25 mg rilpivirina (RPV)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir durante una comida.

Intelence ✔
Para personas que ya han hecho varios tratamientos con cepas virales resistentes a ITINN

200 mg etravirina (ETR)
Una pastilla, dos veces por día. Ingerir luego de una comida.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas orales de 100 mg y 200 mg. Pastillas orales de 25 mg solo disponibles como medicamento de marca.

Pifeltro ✔
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas (como un componente de Delstrigo, o en combinación con Descovy, Truvada o Cimduo)

100 mg doravirina (DOR)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con o sin alimentos.

Sustiva ✔
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas (como un componente de Atripla, Symfi, o Symfi Lo, o en combinación con Descovy, Truvada o Cimduo)

600 mg efavirenz (EFV)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir con el estómago vacío, preferentemente a la hora de acostarse.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas orales de 600 mg. Disponible como genérico solo para pastillas orales de 50 mg y 200 mg.

INHIBIDORES DE LA PROTEASA (IP) Reforzados y no reforzados

Prezcobix ✔
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas o como un componente de un régimen inicial preferido para personas con VIH que hayan tomado Apretude (CAB-LA) para PrEP previamente y estén comenzando la medicación antes de que se encuentren disponibles los resultados de las pruebas de resistencia

800 mg darunavir, 150 mg cobicistat
DRV (IP), COBI (potenciador FC)
Una pastilla, una vez por día. Ingerir junto con alimentos.

Prezista ✔
Se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas o como un componente de un régimen inicial preferido para personas con VIH que hayan tomado Apretude (CAB-LA) para PrEP previamente y estén comenzando la medicación antes de que se encuentren disponibles los resultados de las pruebas de resistencia

darunavir (DRV)
Una pastilla de 800 mg con 100 mg de Norvir (ritonavir) o 150 mg de Tybost, una vez por día para terapia de primera vez y para adultos que ya han hecho varios tratamientos sin resistencia relacionada al Prezista; o una pastilla de 600 mg más 100 mg de Norvir, dos veces por día, para personas que ya han hecho varios tratamientos con resistencia relacionada con Prezista. Prezista tiene que tomarse con Norvir o Tybost. Ingerir junto con alimentos.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas orales de 600 mg y 800 mg. Pastillas orales de 75 mg y 150 mg y suspensión oral de 100 mg/ml solo disponibles como medicamento de marca.

POTENCIADORES FARMACOCINÉTICOS (PFC)

Norvir ✔
Utilizado como refuerzo para otros medicamentos; se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

ritonavir (RTV)
Utilizado como refuerzo, también como antirretroviral. 100 a 400 mg, administrados una o dos veces por día con otro IP no reforzado. Debe ingerirse junto con alimentos.
■ Disponible como genérico y de marca para pastillas orales de 150 mg. Paquete oral de Norvir 100 mg solo disponible como medicamento de marca.

Tybost ✔
Utilizado como refuerzo para otros medicamentos; se recomienda como un componente de un régimen inicial en ciertas situaciones clínicas

150 mg cobicistat
COBI (potenciador FC)
Utilizado solo como refuerzo, **no como antirretroviral**. Una pastilla, una vez por día, ingerida al mismo tiempo junto con Prezista 800 mg o Reyataz 300 mg. Ingerir junto con alimentos.

PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN (PrEP)

MEDICAMENTO ORAL

Descovy para PrEP ★
Aprobado por la FDA para la prevención del VIH (PrEP)

200 mg emtricitabina, 25 mg tenofovir AF
FTC y TAF (dos ITIN)
Para la prevención del VIH en adultos y adolescentes con VIH negativo que pesen al menos 77 libras (35 kg). Tomar una pastilla una vez por día, con o sin alimentos. Hasta el momento, Descovy para PrEP no está aprobado por la FDA para la prevención del VIH para personas a quienes se les asignó el sexo femenino al nacer.

MEDICAMENTO ORAL

Truvada para PrEP ★
Aprobado por la FDA para la prevención del VIH (PrEP)

200 mg emtricitabina/300 mg tenofovir DF
FTC y TDF (dos ITIN)
Para adultos y adolescentes con VIH negativo que pesen al menos 77 libras (35 kg), una pastilla una vez por día, con o sin alimentos.
■ Disponible como genérico.

INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA

Apretude ●
Aprobado por la FDA para la prevención del VIH (PrEP)

suspensión inyectabe de liberación prolongada de cabotegravir (CAB-LA)
Para adultos y adolescentes con VIH negativo que pesen al menos 77 libras (35 kg). Terapia opcional diaria oral de alrededor de un mes antes del comienzo de las inyecciones, que consiste en una pastilla de 30 mg de cabotegravir. Una inyección mensual de acción prolongada intramuscular en el glúteo de 600 mg durante los dos primeros meses y, en lo sucesivo, una inyección cada dos meses. Sin restricción de alimentos.

FOTO NO DISPONIBLE

INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA

lenacapavir ●
Se prevé aprobación de la FDA para la prevención del VIH (PrEP)

marca aún sin determinar
lenacapavir inyectable de acción prolongada (LEN LA)
Todavía sin aprobación al momento de la publicación.
Dos inyecciones subcutáneas de 463.5 mg (un total de 927 mg) en el día 1, más una dosis de ataque de LEN oral (600 mg en el día 1 y otra vez en el día 2), continuando en adelante con dos inyecciones de 463.5 mg (1.5 ml cada una) cada seis meses.

Medicamentos de generaciones anteriores Estos medicamentos raramente se recetan:

Aptivus (tipranavir, TPV); **Combivir*** (lamivudina/zidovudina, 3TC/AZT); **Epzicom**** (abacavir/lamivudina/3TC Evotaz atazanavir/cobicistat, ATZ/COBI); **Fuzeon** (enfuvirtida, T-20, o ENF); **Kaletra** (lopinavir/ritonavir, LPV/r); **Lexiva*** (fosamprenavir cálcico, FPV); **Retrovir** (zidovudina, AZT o ZDV); **Reyataz** (atazanavir sulfato, ATV); **Viracept** (nelfinavir, NFV); **Viramune/Viramune XR*** (nevirapina, NVP); **Ziagen*** (abacavir sulfato)

* Combivir, Lexiva, Viramune/Viramune XR y Ziagen se han discontinuado.
** Se discontinuó la marca Epzicom; pastillas orales de abacavir 600 mg / lamivudina 300 mg están disponibles como genérico

Walgreens

PATROCINADOR DE LA EDICIÓN DE BOLSILLO
DE LA TABLA DE MEDICAMENTOS PARA VIH DE POSITIVELY AWARE 2025

Visite HIV.walgreens.com para conocer la lista de farmacias Walgreens que se especializan en atención de VIH/SIDA y otros recursos. Vea la información completa para la prescripción de medicamentos, incluso advertencias resaltadas, en dailymed.nlm.nih.gov.

PIDA MÁS COPIAS de la edición de bolsillo de la Tabla de Medicamentos para VIH o de la Guía de Medicamentos para VIH de POSITIVELY AWARE, vaya a positivelyaware.com/subscribe. Consulte la Guía de Medicamentos para VIH completa en positivelyaware.com.

© 2025 POSITIVELY AWARE